

Brassicacis

Pour Pâturage

Brassicacis : navet fourrager, colza et chou fourrager, donnent une fourragère de qualité élevée pour le pâturage en automne. Semés en été sur des sols bien drainés et fertiles, ils devraient être pâturés en bande pour éviter de grandes pertes. Un type de foin ou de pâturage permanent doit toujours être disponible pour assurer que le bétail a suffisamment de fibre dans leur diète. En semant du bras sica, il est recommandé que le lit de semis soit roulé après le semis pour aider à maintenir l'humidité.

| ESPECES | TAUX DE SEMIS | SUGGESTIONS D'UTILISATION |
|--|---------------|--|
| Navet fourrager Samson ou Rondo | 2-3 kg/acre | Semis d'avril à août. Semer 12-14 semaines avant que le navet soit pâturé. Le bétail va pâturer les feuilles, ensuite les racines. Pâturage en bande de 6' va limiter les dommages et assurer une ingestion totale de la plante. Le navet fourrager est très flexible, mais pas très résistant à l'hiver. |
| Chou fourrager Keeper | 2-2.5 kg/acre | Les feuilles et la tige du chou fourrager sont hautement appétentes et élevées en protéine. La récolte devrait être prête à être récoltée ou pâturée de 10-15 semaines après le semis, entre la mi-avril et la mi-juillet. La récolte peut être utilisée entre sept. et déc. et est pâturée en bande. La variété Keeper est très résistante à l'hiver et a une excellente résistance à la verse. |
| Radis Tapper | 2-3 kg/acre | Ajouter Jackhammer à un pâturage existant pour fournir de la protéine élevée à un régime pour début de l'hiver. Pâturer ou couper l'herbe rase avant le semis et avoir une humidité adéquate. La mort hivernale élimine le besoin de labour en automne. Le semis se fait de la mi-août à tôt en septembre. |

**Si semé à la volée, augmenter un peu les taux ci-dessus.