

Sorgho Soudan

Fourragère d'urgence

Les hybrides Sorgho Soudan sont une bonne option pour une fourragère d'urgence de qualité élevée. Il peut être utilisé pour l'ensilage, de l'engrais vert ou du pâturage. La première coupe est prête environ 60-65 jours après le semis. Étant sensible à la gelée, le Sorgho ne devrait être semé que tard en mai ou à la mi-juin. Pour un regain plus rapide après la première coupe, laisser 10-18 cm de chaume. La seconde coupe sera prête 30-35 jours plus tard.

Le Sorgho Soudan peut être pâturé, mais ne pas laisser le bétail dans le champ avant 45 cm. Similaire au Millet Perlé, le Sorgho peut facilement être piétiné et devrait donc être pâturé en bande pour éviter de plus grandes pertes.

L'empoisonnement à l'acide prussique est un problème si le Sorgho est donné à manger, surtout les jeunes plants qui contiennent un niveau d'acide prussique plus élevé.

RÉDUIRE LE RISQUE D'EMPOISONNEMENT À L'ACIDE PRUSSIQUE

- Ne pas pâturer avant une hauteur de moins 45-60cm (18-24") de haut.
- Ne pas ensiler du sorgho de plus de 76cm (30") 3 jours après une gelée mortelle
- Après une sécheresse, ne pas pâturer les animaux sur une nouvelle récolte après une pluie

SORGHO SOUDAN BMR

Avec une nervure brune qui donne une qualité fourragère plus élevée.

Taux de Semis Suggéré: (30 - 50 lbs/âc)

Fertiliser selon le test de sol. Les exigences en nutriment sont similaires au maïs et sont importants pour produire une récolte à protéine élevée.